

一元一次不等式

不等式

不等號的意義：

【範例】：求一元一次方程式， $2x + 3 = 4x - 5$ 的解？

$$\begin{aligned} \text{解} : \quad & 2x + 3 = 4x - 5 \\ & 2x - 4x = -5 - 3 \\ & -2x = -8 \\ & 2x = 8 \\ & x = 4 \end{aligned}$$

在此 $2x + 3 = 4x - 5$ 我們稱為一元一次方程式，若我們將等號換為不等號。

$$\begin{aligned} & 2x + 3 > 4x - 5 \\ & 2x + 3 \geq 4x - 5 \\ & 2x + 3 < 4x - 5 \\ & 2x + 3 \leq 4x - 5 \end{aligned}$$

則形如上列的式子，我們稱為一元一次不等式。

【範例】：下面的形式都稱為一元一次不等式：

$$\begin{aligned} (1) \quad & 3x - 2 > 4 \quad , \quad (2) \quad 3x - 1 \geq 5x - 3 \quad , \quad (3) \quad -2x + 5 < 3x + 4 \leq 8x + 3 \\ (4) \quad & |2x - 1| < 5 \quad , \quad (5) \quad |-4x + 1| \geq 5 \end{aligned}$$

【範例】：身體質量指數 = $\frac{\text{體重(kg)}}{\text{身高的平方(m}^2\text{)}}$ 。依照衛生署的資料指出，13 歲的學生

的身體質量指數如果大於 24.8(男生)或 24.6(女生)，就視為過重。

試用符號和不等號來表示這個條件。

解：

如果體重用 w 公斤表示，身高以 h 公尺表示，則上面建議的過重標準，

可以表示為： $\frac{w}{h^2} > 24.8$ (男生)或 $\frac{w}{h^2} > 24.6$ (女生)。

【範例】：下列哪一組數滿足不等式 $c < a - b$ ：

$$(1) \quad a = 0, b = -1, c = 1 \quad (2) \quad a = 1.3, b = 1, c = 0.1$$

解：

$$(1) \quad \because a - b = 0 - (-1) = 1, c = 1, \therefore c = a - b = 1 \quad (\text{不符合})$$

$$(2) \quad \because a - b = 1.3 - 1 = 0.2, c = 0.1, \therefore c = 0.1 < a - b = 0.2 \quad (\text{符合})$$

答：第二組滿足不等式 $c < a - b$

$h \geq 120$ 和 $a \leq 80$ 的意義：

在前面的例子，因為語意明確，所以比較不會引起混淆。下面我們來看兩個敘述的意義，在生活上常常會引起混淆。

【範例】：身高在 120 公分以上要買全票。

說明：120 公分以上到底包不包含 120 公分？

實際上此題是不包含 120 公分的，而在往後的題目中，除了題目說明是大於等於 120 以上公分才有等號，否則只有單單一個以上是都不包含等號的。

如果用 b 代表身高，則「身高在 120 公分以上要買全票。」可簡記為：
「 $b > 120$ 」，其中「 $>$ 」要讀作「大於」，也可讀作「不小於或等於」。

【範例】：如果小誠這次段考的數學成績在 80 分以下，就要禁止打電玩一個月。

說明：數學成績在 80 分以下，如果剛好考 80 分，還能打電玩嗎？

「如果小誠這次段考的數學成績少於 80 分，就要禁止打電玩一個月。」

如果用 a 代表這次段考的數學分數，那「如果小誠這次段考的數學成績少於 80 分，就要禁止打電玩一個月。」可簡記為：「 $a < 80$ 」，其中「 $<$ 」要讀作「小於」，也可以讀作「不大於或等於」。

【範例】：到郵局寄長方體的包裹時，郵局規定：「長方體的最長邊不得超過 150 公分，另外兩邊和的兩倍加上最長邊不能超過 300 公分。」請利用不等號來表示這個規定。

解：設最長邊的長度為 a 公分，兩邊的長度分別為 b 公分、 c 公分。

則「最長邊不得超過 150 公分」可表示成： $a \leq 150$ 。

「兩邊和的兩倍加上最長邊不能超過 300 公分」可表示成： $2(b + c) + a \leq 300$ 。

所以，如果長方體的三邊長為 a 、 b 、 c ，而且 a 為最長邊，

則此規定可表示成： $a \leq 150$ 而且 $a + 2b + 2c \leq 300$ 。

【範例】：如果有一個長方體盒子的三邊長為： a 、 b 、 c (公分)，且 a 為最長邊，並規定 $a \geq 100$ (公分)而且 $a + b + c \leq 200$ (公分)。請問下列哪一個符合此規定？

(1) 50 公分、50 公分、100 公分 (2) 80 公分、80 公分、100 公分

解：(1) 最長邊是 $100 \geq 100$ (公分)而且 $50 + 50 + 100 = 200 \leq 200$ (公分)

所以此正方體符合規定。

(2) 最長邊是 $100 \geq 100$ (公分)但是 $80 + 80 + 100 = 260 > 200$ (公分)

此正方體不符合規定。

$36 < t < 37$ 的意義：

在許多公共場合未發現到許多與不等號相關的規定。例如：坐公車 100 公分以下可以半價。去電影院看電影，身高如果在 100 公分和 130 公分之間，可以買半票。量體溫時，溫度在 36°C 和 37°C 之間，就算是正常體溫。

而這些例子中有些有用到「之間」這個敘述，都會牽涉到兩個不等式。

【範例】：「體溫在 36°C 和 37°C 之間(不包含 36°C 和 37°C)，算是正常體溫。」試著將這句話用不等號來表示。

解：假設用 t 表示體溫，則可將上面的條件改寫成： $t < 37$ 且 $t > 36$

又為了方便可將兩個不等式合併：

$\because t > 36$ 可寫成 $36 < t$ ，而且 $t < 37$ $\therefore 36 < t < 37$

或者是：

$\because t < 37$ 可寫成 $37 > t$ ，而且 $t > 36$ $\therefore 37 > t > 36$

所以「體溫在 36°C 和 37°C 之間(不包含 36°C 和 37°C)」這個敘述，

可表示成： $36 < t < 37$ 或 $37 > t > 36$

【範例】：試著用符號和不等號來表示下列的敘述：

(1) 陳老師從台北開車回來台中的時速都在 90 公里到 100 公里之間(包含 90 公里和 100 公里)。

(2) 小誠家的面積小於 60 坪。

(3) x 是小於 10 的正數。

解：(1) 設車速每小時 x 公里，依題意： $x \geq 90$ 且 $x \leq 100$

\therefore 可表示成 $90 \leq x \leq 100$ 。

(2) 設小誠家的面積為 x 坪，依題意： $x < 60$ ，且面積一定為正數， $\therefore x > 0$

則此題可表示成： $0 < x < 60$ 。

(3) 依題意： $x < 10$ ，又 $\because x$ 是正數， $\therefore x > 0$

則此題可表示成： $0 < x < 10$ 。

【範例】：試著用合併的不等式來表示下列各式：

(1) 參加畢業旅行的人數不到 50 人，可是按照規定：每團人數一定要滿 10 人才能組成一團。

(2) 琦琦的身體質量指數不少於 17.5 但是少於 22.5。

解：(1) 設有 x 人，依題意： $x < 50$ 且 $x \geq 10$ \therefore 可表示成： $10 \leq x < 50$

(2) 設琦琦的身體質量指數為 x ，依題意： $x \geq 17.5$ 且 $x < 22.5$

\therefore 可表示成： $17.5 \leq x < 22.5$



小 試 身 手

【例題 1】

用不等式表示下列的敘述：

- (1) x 是小於 8 的正數。
- (2) b 是大於 -3 的負數。
- (3) $3x$ 小於或等於 120。

解：

【例題 2】

用不等式表示下列的敘述：

- (1) x 、 y 兩數的乘積比 -20 小。
- (2) $b - 5$ 不小於 5。
- (3) 若以 w 表示體重，用不等式表示

「體重不低於 58 公斤且未滿 65 公斤」

解：

【例題 3】

下列那一組數滿足不等式： $2a \geq b + 1$

- (1) $a = 0$ ， $b = -1$
- (2) $a = -2$ ， $b = -2$

解：

【例題 4】

下列那一組數滿足不等式： $a + 2 \leq 2b$

- (1) $a = -1$ ， $b = 0$
- (2) $a = -3$ ， $b = 1$

解：

【例題 5】

如果有兩個不等式 $x > -3$ 以及 $x < 7$ 同時成立，請將兩式合併為一個不等式。

解：

【例題 6】

如果有兩個不等式 $2x \leq 8$ 以及 $3x \geq -15$ 同時成立，請將兩式合併為一個不等式。

解：

不等式的性質

正負數、減法和大小比較：

不管是運用數的運算規律，還是利用數線的表示法，我們都學過「正數加正數還是正數，負數加負數還是負數」的規律。乘法也有「正正得正，負負得正」、「正負得負，負正得負」的規律。下面我們來做個範例。

【範例】：在下列□中，填入「>」或「<」：

(1) 如果 $a > 0$ ， $b > 0$ ，則 $a + b$ □ 0 ， $a \cdot b$ □ 0 。

(2) 如果 $a < 0$ ， $b < 0$ ，則 $a + b$ □ 0 ， $a \cdot b$ □ 0 。

解：(1) ∵ a 、 b 都是正數。 ∴ $a + b$ 、 $a \cdot b$ 都會是正數。

則： $a + b > 0$ ， $a \cdot b > 0$ 。

(2) ∵ a 、 b 都是負數。 ∴ $a + b$ 還是負數。

但是 ∵ 「負負得正」 ∴ $a \cdot b$ 是正數。

則： $a + b < 0$ ， $a \cdot b > 0$ 。

但是在減法時，因為是兩個數相減的結果，所以有可能是正數、可能是負數、也可能是 0。因此，要判斷兩數相減結果的不等號為何？就要利用「大減小為正，小減大為負」這個規律了。

利用不等式記法，將規律改寫如下：

「大減小為正」：如果 $a > b$ ，則 $a - b > 0$ 。

「小減大為負」：如果 $a < b$ ，則 $a - b < 0$ 。

【範例】：在下列□中，填入「>」或「<」：

(1) $\frac{1}{2} - \frac{1}{9}$ □ 0 (2) $\frac{4}{15} - \frac{4}{9}$ □ 0

解：(1) ∵ $\frac{1}{2} > \frac{1}{9}$ ∴ $\frac{1}{2} - \frac{1}{9} > 0$ 。

(2) ∵ $\frac{4}{15} < \frac{4}{9}$ ∴ $\frac{4}{15} - \frac{4}{9} < 0$ 。

【範例】：請問下列哪一個式子表示「正數的相反數是負數」這個規律。

(1) 若 $a > 0$ ，則 $-a > 0$ (2) 若 $a > 0$ ，則 $-a < 0$ (3) 若 $a < 0$ ，則 $-a > 0$

解：∵ a 是正數，∴ $a > 0$ 。

∴ a 的相反數為 $-a$ 而且為負數，∴ $-a < 0$ 。

則「正數的相反數是負數」可用，若 $a > 0$ ，則 $-a < 0$ 來表示。

我們在下面會舉一些範例，來說明用減法來比較數的大小，有的時候會比直接計算出結果更容易。

【範例】：比較下列各組的大小：(1) $(9.99)^2$ 和 9.99 (2) $(0.99)^2$ 和 0.99

$$\begin{aligned}\text{解} : (1) (9.99)^2 - 9.99 &= 9.99 \times 9.99 - 9.99 \\ &= 9.99 \times (9.99 - 1) \\ &= 9.99 \times 8.99 > 0\end{aligned}$$

$$\therefore \text{「大減小為正」} \therefore (9.99)^2 > 9.99$$

$$\begin{aligned}(2) (0.99)^2 - 0.99 &= 0.99 \times 0.99 - 0.99 \\ &= 0.99 \times (0.99 - 1) \\ &= 0.99 \times (-0.01) < 0\end{aligned}$$

$$\therefore \text{「小減大為負」} \therefore (0.99)^2 < 0.99$$

備註：當 $a > 1$ 時，若 $n > m > 0$ ，則 $a^n > a^m$ 。

當 $0 < a < 1$ 時，若 $n > m > 0$ ，則 $a^n < a^m$ 。

【範例】：比較下列各組的大小：(1) $(9.99)^4$ 和 $(9.99)^2$ (2) $(0.99)^4$ 和 $(0.99)^2$

$$\text{解} : (1) \because 9.99 > 1, \therefore (9.99)^4 > (9.99)^2。$$

$$(2) \because 0 < 0.99 < 1, \therefore (0.99)^4 < (0.99)^2。$$

三一律：

如果 a 和 b 表示任意兩數，我們知道 a 和 b 的大小關係，恰好是下列三者中的一個：

$$a > b、a = b、a < b。$$

這三種情況有一種會成立，而且只有一種會成立。在數學上，我們稱之為三一律。

遞移律：

已知小誠比小愛高，而小愛又比小琪還高，所以我們知道小誠會比小琪還高。

再舉一個分數的例子，帶分數 $1\frac{89}{199}$ 比 1 還大，1 比真分數 $\frac{79}{89}$ 還大，所以 $1\frac{89}{199}$

比 $\frac{79}{89}$ 還大。像這樣間接利用第三個數來比較大小時，就有用到遞移律。

如果有三個任意數 a 、 b 、 c ，則遞移律可表示成：

$$\text{若 } a > b \text{ 且 } b > c, \text{ 則 } a > c。$$

$$\text{若 } a < b \text{ 且 } b < c, \text{ 則 } a < c。$$

$$\text{若 } a \geq b \text{ 且 } b \geq c, \text{ 則 } a \geq c。$$

$$\text{若 } a \leq b \text{ 且 } b \leq c, \text{ 則 } a \leq c。$$

【範例】：如果 $a + 1 = b$ ， $b + 1 = c$ ，試比較 a 、 b 、 c 三個數的大小。

$$\text{解} : \because a + 1 = b, \therefore a < b。$$

$$\because b + 1 = c, \therefore b < c。$$

則由遞移律可以得知： $a < b < c$ 。

【範例】：如果 $a = b - 1$ ， $a = c + 1$ ，試比較 a 、 b 、 c 三個數的大小。

解 $\because a = b - 1$ ， $\therefore a < b$ 。

$\because a = c + 1$ ， $\therefore c < a$ 。

則由遞移律可以得知： $c < a < b$ 。

不等號在數線上的表法：

1. 「 $x = y$ 」：等號用來表示兩個量 x 與 y 是相等。


【範例】： $2 + 5 = 7$

【範例】： $3x = 12$

2. 「 $x > y$ 」：大於符號用來表示 x 是大於 y 。

【範例】： $2 + 8 > 7$

【範例】： $x > 2$ 表示數線上所有大於 2 的點。




3. 「 $x \geq y$ 」：大於等於符號用來表示 x 是大於或等於 y 。

【範例】： $2 + 8 \geq 7$

【範例】： $2 + 8 \geq 10$


【範例】： $x \geq 2$ 表示數線上所有大於等於 2 的點。



4. 「 $x < y$ 」：小於符號用來表示 x 是小於 y 。

【範例】： $2 + 8 < 27$

【範例】： $x < -4$ 表示數線上所有小於 -4 的點。




5. 「 $x \leq y$ 」：小於等於符號用來表示 x 是小於或等於 y 。

【範例】： $2 + 8 \leq 17$

【範例】： $2 + 8 \leq 10$

【範例】： $x \leq -4$ 表示數線上所有小於或等於 -4 的點。




不等式的移項規則：

1. 不等號中一個數或未知數，從不等式一邊移到另一邊時，則要變號，但不等號不變。

【範例】：化簡不等式： $x - 2 > 4$ ，並在數線上標示其範圍。

解：


$$\begin{aligned}x - 2 > 4 &\Leftrightarrow x > 4 + 2 \\ &\Leftrightarrow x > 6\end{aligned}$$



【範例】：化簡不等式： $5x - 2 \leq 2x + 4$ ，並在數線上標示其範圍。

解：

$$\begin{aligned}5x - 2x \leq 4 + 2 &\Leftrightarrow 3x \leq 6 \\ &\Leftrightarrow x \leq 2\end{aligned}$$



【範例】：化簡不等式： $5(x - 4) < 2(x + 4)$ ，並在數線上標示其範圍。

解：

$$\begin{aligned}5x - 20 < 2x + 8 &\Leftrightarrow 5x - 2x < 8 + 20 \\ &\Leftrightarrow 3x < 28 \\ &\Leftrightarrow x < \frac{28}{3}\end{aligned}$$




2. 不等號兩邊同乘正數時不等號不變。

【範例】：化簡不等式： $\frac{1}{4}(x + 2) < 6$ ，並在數線上標示其範圍。


解：

$$\begin{aligned}\frac{1}{4}(x + 2) < 6 &\Leftrightarrow \frac{1}{4}x + \frac{1}{2} < 6 \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{4}x < 6 - \frac{1}{2} \\ &\Leftrightarrow 4 \times \frac{1}{4}x < 4 \times \frac{11}{2} \\ &\Leftrightarrow x < 22\end{aligned}$$



【範例】：化簡不等式： $2(x-2) > 6$ ，並在數線上標示其範圍。


$$\begin{aligned} \text{解} : 2(x-2) > 6 &\Leftrightarrow 2x - 4 > 6 \\ &\Leftrightarrow 2x > 10 \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{2} \times 2x > \frac{1}{2} \times 10 \\ &\Leftrightarrow x > 5 \end{aligned}$$



3. 不等號兩邊同乘負數時大於變為小於。


【範例】：化簡不等式： $-x+2 > 7$ ，並在數線上標示其範圍。

$$\begin{aligned} \text{解} : -x+2 > 7 &\Leftrightarrow -x > 5 \\ &\Leftrightarrow x < -5 \quad (\text{同乘負數, 「>」變「<」}) \end{aligned}$$



【範例】：化簡不等式： $-\frac{1}{4}(x+2) > 6$ ，並在數線上標示其範圍。


$$\begin{aligned} \text{解} : -\frac{1}{4}(x+2) > 6 \\ &\Leftrightarrow (x+2) < 6 \times (-4) \quad (\text{兩邊同乘}-4, \text{「>」變「<」}) \\ &\Leftrightarrow x+2 < -24 \\ &\Leftrightarrow x < -24-2 \\ &\Leftrightarrow x < -26 \end{aligned}$$



4. 不等號兩邊同乘負數時小於變為大於。

【範例】：化簡不等式 $\frac{1}{4}(x+2) < 6(2x-4)$ 。


$$\begin{aligned} \text{解} : \frac{1}{4}(x+2) < 12x-24 \quad (\text{兩邊同乘 } 4) \\ &\Leftrightarrow x+2 < 4(12x-24) \\ &\Leftrightarrow x+2 < 42x-96 \\ &\Leftrightarrow x-42x < -98 \\ &\Leftrightarrow -41x < -98 \quad (\text{兩邊同乘 } -1, \text{「<」變「>」}) \\ &\Leftrightarrow 41x > 98 \\ &\Leftrightarrow x > \frac{98}{41} \end{aligned}$$



5. 不等號兩邊同乘負數時大於等於變為小於等於。

【範例】：化簡不等式： $-3x-7 \geq 13-2x$ ，並在數線上標示其範圍。


$$\begin{aligned} \text{解} : -3x-7 &\geq 13-2x \Leftrightarrow -3x+2x \geq 13+7 \\ &\Leftrightarrow -x \geq 20 \quad (\text{兩邊同乘 } -1, \text{「}\geq\text{」變「}\leq\text{」}) \\ &\Leftrightarrow x \leq -20 \end{aligned}$$



6. 不等號兩邊同乘負數時小於等於變為大於等於。

【範例】：化簡不等式： $-5(x+2) \leq 2x+6$ ，並在數線上標示其範圍。

$$\begin{aligned} \text{解} : -5(x+2) &\leq 2x+6 \\ &\Leftrightarrow -5x-10 \leq 2x+6 \\ &\Leftrightarrow -5x-2x \leq 6+10 \\ &\Leftrightarrow -7x \leq 16 \quad (\text{兩邊同乘 } -\frac{1}{7}) \\ &\Leftrightarrow x \geq -\frac{16}{7} \end{aligned}$$



結論：當 $a > b$ 時，

推論 1：對任意數 c ，我們恆有 $a+c > b+c$ ， $a-c > b-c$ ；

推論 2：對任意正數 $c > 0$ ，我們恆有 $ac > bc$ ， $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$ ；

推論 3：對任意負數 $c < 0$ ，我們恆有 $ac < bc$ ， $\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$ 。

此外，對於不等號「 $<$ 」、「 \geq 」和「 \leq 」，上述的推論也都成立。



小 試 身 手

【例題 1】

下面的形式哪些稱為一元一次不等式，請在括號內打勾：

() $-2 > x - 2$

() $3(x + 5) \geq 5x - 3$

() $x + 5 < 3\frac{x}{2} + 4 \leq \frac{x}{3} + 3$

() $|2x - 1| < |-4x + 1|$

() $3x - 4 \geq 5x + 1$

【例題 3】

請在數線上標出下列不等式的範圍：

(1) $x > -1$; (2) $0 < x < 2$

解：

(1)

(2)

【例題 5】

請在數線上標出下列不等式的範圍：

(1) $-4 \leq x \leq -2$; (2) $-2 \leq x \leq 4$

解：

(1)

(2)

【例題 7】

化簡下列各一元一次不等式：

(1) $x + 5 > -2$

(2) $x - 6 < 2$

【例題 2】

下面的形式哪些稱為一元一次不等式，請在括號內打勾：

() $-\frac{x}{2} + 1 > x - 2$

() $x - \frac{x}{3} \geq 5\frac{x}{3} - 9$

() $3x + 7 < 3x + 4 \leq \frac{x}{3} + 3$

() $|2x - 1| < |-4x + 1|$

() $|\frac{x}{2} - 1| \geq 2\frac{x}{2} + 9$

【例題 4】

請在數線上標出下列不等式的範圍：

(1) $x \geq 2$; (2) $-1 \leq x < 3$

解：

(1)

(2)

【例題 6】

請在數線上標出下列不等式的範圍：

(1) $x > 2$; $x < -1$; (2) $x \geq 2$; $x \leq -1$

解：

(1)

(2)

【例題 8】

化簡下列各一元一次不等式：

(1) $-15 > x - 9$

(2) $-6 < x + 2$

【例題 9】

化簡下列各一元一次不等式：

(1) $3x + 5 > -2$

(2) $2x - 10 < 22$

解：

【例題 10】

化簡下列各一元一次不等式：

(1) $2x + 5 \leq -21$

(2) $5x - 10 \geq x + 6$

解：

【例題 11】

化簡下列各一元一次不等式：

(1) $\frac{2}{3}(3x + 9) < 6\left(\frac{2}{3}x - 1\right)$

(2) $-\frac{1}{4}(12x + 28) \leq 6x + 2$

解：

【例題 12】

化簡下列各一元一次不等式：

(1) $-2(3x + 1) \leq 5x + 9$

(2) $-\frac{2}{3}(6x + 1) > 2\frac{2}{3}$

解：

【例題 13】

化簡下列各一元一次不等式：

$5x + 2 < 2(x - 1) \leq x + 5$

解：

【例題 14】

化簡下列各一元一次不等式：

$3x - 9 < 6(x + 2) < 3x - 1$

解：